

Contribution à la connaissance de l'Histoire Naturelle de l'île de Chypre Coleoptera: Curculionidae I

par Gabriel ALZIAR*

* Jardin botanique de la Ville de Nice, 78 avenue de la Corniche Fleurie, F-06000 NICE (France)

Résumé: l'auteur donne une liste préliminaire des Curculionidae de l'île de Chypre basée sur des données de la littérature et de récoltes diverses dont les siennes propres. Parmi ces dernières, plusieurs espèces n'étaient pas encore signalées de l'île.

Mots-clés: Chypre, Curculionidae, plante-hôte, chorologie.

Summary: The author gives a preliminary list of Curculionidae from Cyprus island, based on data from literature and various collections including its own. Among those, several species were not yet reported from the island.

Key-words: Cyprus, Curculionidae, host-plant, chorology.

La faune entomologique de Chypre est, à l'exception de quelques familles, imparfaitement connue: c'est le cas des Curculionidae pour lesquelles n'existent que quelques données éparées dans le temps et fort peu représentatives de l'ensemble de l'île. Il existe bien la liste de G.P.GEORGHIU (1977) mais elle concerne essentiellement les "...Species of Economic Importance..." et nécessite des corrections nomenclaturales importantes. Le présent article est une synthèse de certaines données de la littérature, des recherches effectuées par l'auteur au cours de ses différents voyages et missions dans l'île, des insectes de la collection du Department of Agriculture de Nicosie dont beaucoup ont été déterminés par G.A.K.MARSHALL et donc avec exactitude tandis que certains genres sont à revoir entièrement; enfin quelques spécimens prêtés ou cédés par nos collègues G.OSELLA (L'Aquila), et P.BERGER (Meylan). Son but ainsi que celui des articles qui le suivront est de servir à l'élaboration d'une future Faune des Curculionides de Chypre.

MM. Carlo PESARINI (Milan) et Roberto CALDARA (Milano) ont effectué diverses déterminations sur les récoltes de 1974, 1977 et 1978, ce dont je les remercie bien vivement. Qu'il me soit permis de remercier aussi Mme. Joëlle DEFAY pour la qualité de ses dessins qui font ressortir la réelle beauté de la texture et de l'ornementation des Charançons. De même je tiens à remercier mon épouse qui s'est astreinte à récolter du matériel en 1977 et 1978, sur la commune d'Akaki, où elle a découvert quelques taxons intéressants (récoltes signalées par "H.ALZIAR").

Les abréviations suivantes sont utilisées dans le texte: CTGN = Collection du Département de l'Agriculture (Τμήμα Γεωργίας); Cat.Junk = Catalogus Coleopterorum, édité par le Dr. W. Junk; Cat. Winkler = Catalogus Coleopterorum regionis palaearcticae, A.Winkler, 1924-1932.

Biocosme Méditerranéen, Nice, 12(2/3): 65-82, (1995)

D'autre-part j'ai signalé par un "*" les espèces qui sont certainement nouvelles pour Chypre, en soulignant qu'il s'agit souvent simplement de déterminations erronées plus que de découvertes réelles.

OTIORHYNCHINAE

Otiorhynchus crassicollis Stierl., 1861. Cat. Winkler, 1932.

Otiorhynchus cypricola Rche., 1857. Cat. Winkler, 1932.

Otiorhynchus ovalipennis Boh., 1843. Panayia, Paphos, Perapedhi, Prodhromos, Moutoullas, Marathasa (CTGN).

Myllocerus damascenus Miller, 1861. Cat. Junk, 1937.

Elytrodon distincticornis Pic, 1911. Cat. Winkler, 1932.

Desbrochersella insulana M.González, 1970. Yermasoya river, GONZALEZ 1970.

Phyllobius curvipes Pic, 1919. Cat. Winkler, 1932.

Phyllobius gloriosus Dan., 1903. Cat. Winkler, 1932.

Omiamima cypricus (Seidl.), 1868. Cat. Winkler, 1932.

BRACHYDERINAE

Trachyploeus truquii Seidl. 1868. Cat. Winkler, 1932; Cat. Junk, 1937.

Psalidium aurigerum Desbr., 1894. Cat. Winkler, 1932; Cat. Junk, 1936; Paphos, Paralimni (CTGN); GEORGHIU 1977; Akaki (Nicosia), 3, 28-IV-1977 et 8-9-V-1978 (H.ALZIAR !). Fig. 1.

Polydrusus baudii (Faust), 1889. Cat. Winkler, 1932; Cat. Junk, 1936.

Polydrusus rhodiacus Schilsky, 1912. Cat. Winkler, 1932; Cat. Junk, 1936; Panagra (Kyrenia), 1, 8-VI-1974, (Kyrenia), 4, 28-V-1974, et Diorios (Kyrenia), 4, 28-V-1974, sur *Pistacia lentiscus*, Vassilia (Kyrenia), 1, 29-VI-1974, Lapithos (Kyrenia), 8, 31-V-1974 (tous: ALZIAR). Fig. 2.

Dichorhinus pseudoscythopus Desbr., 1875. Cat. Winkler, 1932

Genre *Strophomorphus* Seidlitz: je ne citerai ici que pour mémoire les espèces citées dans la littérature ou observées car ce genre essentiellement proche-oriental demande à être révisé, ce qui n'a pas été fait depuis REITTER 1895.




Fig. 1 - *Psalidium aurigerum* Desbr., d'Akaki.

Strophomorphus albarius (Reiche), 1857. Athiénou (Nicosia), Panagra (Kyrénia), Diorios (Nicosia) et Bella Païs (Kyrénia), espèce commune du 26-V à 20-VI-1974, sous les pierres et les plantes, parfois sur les arbustes (ALZIAR); GEORGHIU 1977.

Strophomorphus brevithorax Pic, 1908. Cat. Winkler, 1932; Cat. Junk, 1937; Paphos, Engomi, Perapedhi, Nicosia, Trimiklini, Limassol, Polis (CTGN). Diorios (Kyrenia), 1, 28-V-1974 (ALZIAR); GEORGHIU 1977.

Strophomorphus porcellus Schönherr, 1832. Nicosia (CTGN); Ayios Vassilios (Nicosia), 6, 22 et 24-V-1974 (ALZIAR); Diorios (Kyrénia), 1, 28-V-1974, (ALZIAR); GEORGHIU 1977; Akaki (Nicosia), 14, du 26-IV au 19-V-1977 et 12, du 8 au 18-V-1978 (H. ALZIAR !).

Strophomorphus sejugatus Desbr., 1894. Cat. Winkler, 1932; Cat. Junk, 1939; Famagusta, Nicosia, Larnaca, Paphos, Peyia Paphos, Kondea (CTGN); GEORGHIU 1977.

Strophomorphus sublaevigatus Desbr., 1894. Mazotos, Paphos, Nicosia (CTGN); Ayios Vassilios (Nicosia): très commun, du 21 au 24-V-1974 (ALZIAR).

Sciaphilus innotatus Pic., 1927. Cat. Winkler, 1932; Cat. Junk, 1937.

Chiloneus brevithorax Desbr., 1874. Cat. Winkler, 1932; Cat. Junk, 1937; Pervolia (CTGN); GEORGHIU 1977.

Chiloneus scythropoides Reitt., 1915. Cat. Winkler, 1932; Cat. Junk, 1937; Omorphita [Nicosia], Kiti (CTGN); GEORGHIU 1977.

***Caulostrophus javeti** Desbr., 1869. Diorios (Kyrenia), sur *Pinus halepensis*, 1, 28-V-1974 (ALZIAR).

Philopeton (Leptolepus) meridionalis (Jacq.), 1854. Près d'Amathas [?], De VIEDMA 1964.

Sitona intermedius Küster, 1842. Amiandos, Chionistra, Asprokremo [Paphos], Trikoutsia (CTGN), mangeant les feuilles des *Acacia*; GEORGHIU 1977

Sitona limosus Rossi, 1892. Peristerona, Deftera [Nicosia], Kyerou [Nicosia], Nicosia (CTGN); GEORGHIU 1977.

Sitona lineatus (L.), 1758. Nicosia, Larnaca, Peristerona (CTGN); Panagra (Kyrenia), 1, 8-VI-1974 (ALZIAR); GEORGHIU 1977, très nombreux exemplaires en mai 1977 à Akaki (Nicosia), (G. et H. ALZIAR)

***Sitona concavirostris** Hochh., 1851. Ayios Vassilios (Nicosia), 1, 24-V-1974 (ALZIAR); Akaki (Nicosia), 8, 28-IV à 25-V-1977 (G. et H. ALZIAR).

Sitona crinitus (Herbst), 1795. Cat. Junk, 1939; Akaki (Nicosia), 17, nombreux en avril et mai 1977 (G. et H. ALZIAR), sur *Sinapis*, *Vicia* et *Anthemis*.




Fig. 2 - *Polydrusus rhodiacus* Schilsky, de Diorios.

Sitona damascenus Stierl., 1884. Nicosia (CTGN).

**Sitona hispidulus* F., 1776. Akaki (Nicosia), 3, 6 à 13-V-1977 (H.ALZIAR !).

Sitona humeralis Steph., 1831. Nicosia (CTGN).

Sitona ocellatus Küster, 1849. Famagusta, Nicosia (CTGN); Ayios Vassilios (Nicosia), 21-V à 14-VI-1974, et Mammari (Nicosia), 1-VI-1974 (ALZIAR), en tout 17 exemplaires dont 15 ont été trouvés sur *Tamarix*; GEORGHIU 1977; Akaki (Nicosia), 4, du 6 au 23-V-1977 (H.ALZIAR !). Fig.3.

**Sitona puncticollis* Steph., 1831. Akaki (Nicosia) 1, 30-IV-1977, sous une pierre (H.ALZIAR !).

TANYMECINAE

Tanymecus dilaticollis Gyll., 1834. GEORGHIU 1977; Pervolia (Larnaca), 18, 10-IV-1991 (EWALD !), terrain vague sableux.

BRACHYCERINAE

Brachycerus argillaceus Rche., 1857. ZUMPT 1937; Omorphita, Nicosia, Famagusta (CTGN); GEORGHIU 1977.

Brachycerus chevrolati Fahrs., 1840 (= *callosus* Schoenh. 1833) Omorphita (CTGN); GEORGHIU 1977 (sub *B. callosus*).

Brachycerus junix Licht., 1896. Famagusta, Nicosia, Omorphita, Pervolia (CTGN); GEORGHIU 1977.

Brachycerus junix junix Licht., 1896. ZUMPT 1937.

Brachycerus nodulosus Rche., 1857. Famagusta, Kolossi, Pera Pedhi, Nicosia (CTGN); GEORGHIU 1977.

Brachycerus sinuatus Oliv., 1907 var. *lutulentus* Gyll., 1833. Nicosie, ZUMPT 1937.

CLEONINAE

Conorhynchus brevirostris (Gyll.), 1834. Perivolia, Nicosia, Famagusta (CTGN).

Conorhynchus conicirostris (Oliv.), 1807. Nicosia (CTGN).

**Coniocleonus cicatricosus* (Hoppe), 1795. Akaki (Nicosia), 1, 3-V-1977 (H.ALZIAR !).




Fig. 3 - *Sitona ocellatus* Küster, d'Akaki.

Coniocleonus crinipes Fahr., 1842. Cat. Winkler, 1932; Cat. Junk, 1937.

Coniocleonus excoriatus (Gyll.), 1834. Nicosia (CTGN); GEORGHIOU 1977.

**Coniocleonus nigrosuturatus* (Goeze), 1777. Akaki, Famagusta (CTGN); Akaki (Nicosia), 3 en mai 1977 et 3 le 18-V-1978 (G. et H.ALZIAR !).

Coniocleonus planidorsis Fairm., 1879. Cat. Winkler, 1932.

Coniocleonus vittiger Fahr., 1842. Famagusta (CTGN); GEORGHIOU 1977.

Pachycerus madidus Oliv., 1807. Nicosia, Koma tou Yialou (CTGN); GEORGHIOU 1977.

**Rabdorrhynchus* sp. propre *menetriesii* (Gyll.), 1834. Genre nouveau pour l'île; espèce en cours de vérification. Droushia (Paphos), près de Pittokopos, 1, 28-IV-1995, sur *Anchusa italica* (ALZIAR).

Lixus junci Boh., 1836. Larnaca (CTGN); GEORGHIOU 1977; Ayios Vassilios (Nicosia), 11, 25 et 26-VI-1974 (ALZIAR).

Lixus ascanii L., 1767. Famagusta, (CTGN); GEORGHIOU 1977. A revoir à la lumière du travail de DIECKMANN 1980.

Lixus algirus L., 1758. Nicosia, Famagusta, Larnaca, Lapithou, Kouklia, Trikoutsia, Limassol (CTGN); GEORGHIOU 1977; Akaki (Nicosia), 1, 15-V-1978 (H.ALZIAR !).

Lixus scolopax Boh., 1836. Cat. Winkler, 1932; Nicosia (CTGN); Ayios Vassilios (Nicosia), 24 et 25-VI-1974, et Mammari (Nicosia), 1-VI-1974: 6 exemplaires sur *Cynara cardunculus* (ALZIAR); Akaki (Nicosia), 1, 31-V-1977 (ALZIAR); lit du Dhiarizos, 1 km au nord de Khidazi (Paphos), 1, 27-IV-1991 (EWALD et ALZIAR), sur chardon; route d'Ipsonas à Khalassa (Limassol), 1, 27-IV-1991, sur Onopordum; Odhou dint. (Larnaca), 2, 17/18-IV-1993 (MAGNANI !); Parekklisha (Limassol), 3, 18-IV-1993 (MAGNANI !); Pomos dint. (Paphos), 2, 26-IV-1993 (MAGNANI !); Lyso (Paphos), 3, 28-IV-1993 (BERGER !); Drousha (Paphos), 1, 30-IV-1995 (ALZIAR), en loge nymphale dans une tige sèche d'*Echinops spinosissimus*.

Lixus cardui Oliv., 1807. Famagusta, Athalassa, Kiti (CTGN); GEORGHIOU 1977; Akaki (Nicosia), 7, 26 et 27-IV-1977 (H.ALZIAR !); Ayios Yeoryios (Paphos), côte en allant vers Lara, 1, 21-III-1984 (EWALD et ALZIAR); à 1 km au nord de Khidazi (Paphos), berges du Dhiarizos, 1, 27-IV-1991, sur chardon (EWALD !).

Lixus speciosus Mill., 1861. PETRI 1905; Cat. Winkler, 1932; GEORGHIOU 1977.

Larinus onopordi (F.), 1787. Panagra (Nicosia), 4, 8 et 20-VI-1974, dont 3 sur *Echinops spinosissimus* (ALZIAR); Ayios Chrysostomos (Kyrenia), 1, 3-VII-




Fig. 4 - *Hypolixus pulvisculosus* Boh., de Mammari.

1974, sur *Echinops speciosissimus* (ALZIAR); Akrounda (Limassol), 3, 28-IV-1994 (ALZIAR).

Larinus latus Herbst, 1784. Famagusta (CTGN); GEORGHIOU 1977.

Larinus longirostris Gyll., 1836. W.Leondari (CTGN); GEORGHIOU 1977.

**Larinus centaureae* Ol., 1889. Akaki (Nicosia), 1, 9-V-1977 (H.ALZIAR !).

Larinus maculatus Gyll., 1836. Nicosia, Psematismeno, Analiondas [près de Tseri], Famagusta (CTGN); GEORGHIOU 1977.

Larinus orientalis Cap., 1874. Ormithi, Ay. Andronikos, Akhna (CTGN); GEORGHIOU 1977.

Larinus ovaliformis Cap., 1874. Pissouri, Paphos, Nicosia, Akhna (CTGN); GEORGHIOU 1977; Akaki (Nicosia), 1, 9-V-1977 (H.ALZIAR !).

Larinus planus (F.), 1792. Athalassa, Nicosia, Famagusta (CTGN); GEORGHIOU 1977.

Larinus sculus Boh., 1843. Nicosia, Larnaca Lapithou (CTGN); GEORGHIOU 1977.

Larinus syriacus Gyll., 1836. Famagusta, Ormithi, Larnaca, Nicosia. (CTGN); GEORGHIOU 1977; Akaki (Nicosia), 3, 26 et 27-IV-1977 (H.ALZIAR !).

Larinus ursus (F.), 1792. Famagusta, Nicosia (CTGN).

Larinus vulpes (Oliv.), 1808. Nicosia (CTGN).

**Microlarinus lareynii* (J.du Val), 1852. Akaki (Nicosia), 3, 30-IX-1981, sur *Tribulus terrestris* (ALZIAR).

**Rhinocyllus* sp. Genre non encore signalé de Chypre. Nous en avons trouvé de nombreux exemplaires à Amathus et Arménokhori (Limassol), Akaki (Nicosia) et près de Panayia (Paphos), de 1977 à 1991; à notre avis il a été systématiquement confondu avec l'espèce suivante. Détermination spécifique en cours.

Bangasternus orientalis Cap., 1873. Famagusta, Kyrenia, Limassol, (CTGN); GEORGHIOU 1977.

Hypolixus nubilous Boh., 1836. Xylophagou. (CTGN).

Hypolixus pulvisculosus Boh., 1836. Nicosia, Kyrenia, Famagusta, Pervolia (CTGN). Mammari (Nicosia), 1, 1-VI-1974, sur *Tamarix* (ALZIAR); GEORGHIOU 1977. Fig.4.

**Temnorhinus conicirostris* Oliv., 1807. Ayios Vassilios (Nicosia), 2, dont 1 sur *Tamarix*, 21 et 22-V-1974 (ALZIAR).

CURCULIONINAE

Rhytirrhinus deformis Rche., 1858. Nicosia, (CTGN).

**Hypera lunata* (Woll.), 1854. Akaki (Nicosia), 3, 28 et 30-IV-1977, sous des pierres, 2 le 16-V-1977, sous un *Plantago* (H.ALZIAR !).

Hypera pastinacae (Rossi), 1790. Cat.Junk, 1934; Akaki (CTGN); Mammari (Nicosia), 3, 1-VI-1974 (ALZIAR).

Hypera cypris Rche. et Saulcy, 1857. Cat. Winkler, 1932.

Hypera fasciculata (Herbst), 1795. Nicosia(CTGN); GEORGHIOU 1977.

Hypera postica (Gyll.), 1813. Voroklini [Larnaca] (CTGN).

Hypera signata (Boh.), 1834. Akhna (CTGN); GEORGHIOU 1977.

**Hypera trilineata* Marsham, 1802. Akaki (Nicosia), 1, 13-V-1977 (H.ALZIAR !)

Hypera variabilis (Herbst), 1795. Nicosia, Melia, Xylophagou (CTGN); GEORGHIOU 1977.

Donus cypris (Reiche & Saulcy), 1857. Cat.Junk, 1934.

Donus insularis (Cap.), 1867. Cat.Junk, 1934.

Rhytidoderes plicatus (Oliv.), 1790; GEORGHIOU 1977.

Rhytidoderes plicatus (Oliv.), 1790, var. *sculus* Fahrs., 1840. Nicosia, Akaki, Yeri (CTGN); Akaki (Nicosia), 2, le 3 et le 26-V-1977, (H.ALZIAR !); route de Xylophagou à Ayia Thékla (Larnaca), 1, 12-IV-1991, sous une pierre (EWALD !).

Alophus nictitans Boh., 1842. Akhna (CTGN); GEORGHIOU 1977.

CALANDRINAE

Amaurorhinus bewickianus (Wollaston), 1860. FOLWACZNY 1973; OSELLA et al. 1993.

Mesites cunipes (Boh.), 1837. FOLWACZNY, 1973; OSELLA et al., 1993.

Mesites pallidipennis (Boh.), 1837. Larnaka, OSELLA et al., 1993.

Rhyncholus syriacus Desbr. 1892. OSELLA et al., 1993.

Stenoscelis submuricatus (Schönh.), 1837. OSELLA et al., 1993.

Brachytemnus porcatus (Germ.), 1824. Kakoarkaga, Kapouras (CTGN); Larnake [?], Kyrenia, FOLWACZNY 1973; GEORGHIOU 1977; Larnaka, OSELLA et al., 1993.

***Calosirus nigrinus** (Marsh.), 1802. Lapithos (Kyrenia), 1, 30-V-1974 (ALZIAR).

***Stenocarus cardui** (Herbst), 1784. Akaki (Nicosia), 1, 3-V-1977 et 1 le 8-V-1978 (H.ALZIAR !).

Ceutorhynchus assimilis (Payk.), 1792. Nicosia (CTGN).

Ceutorhynchus beckeri Schultze, 1900. Nicosia (CTGN); GEORGHIOU 1977.

Ceutorhynchus cinapis Desbr., 1893. Cat. Winkler, 1932

Ceutorhynchus floralis (Payk.), 1792. Nicosia (CTGN).

Ceutorhynchus hirtulus Germ., 1824. Nicosia (CTGN).

Ceutorhynchus larvatus Schultze, 1896. Deftera (CTGN).

***Ceutorhynchus pallidactylus** Marsham, 1802 (= *quadridens* Panz., 1795). Paphos (CTGN); Akaki (Nicosia), 2, 9 et 10-V-1977, sous *Sinapis* ou *Anthemis*; même localité, 2, 8-V-978 (H.ALZIAR !).

Sitophilus granarius (L.), 1758. (CTGN); GEORGHIOU 1977. Ayios Vassilios (Nicosia), 1, 11-VI-1974.

Sitophilus oryzae (L.), 1758. (CTGN); GEORGHIOU 1977.

Sitophilus sculpturatus Gyll., 1838. Importé (CTGN); GEORGHIOU 1977.

Sitophilus zeamais Motschulsky, 1855. Importé (CTGN).

***Baris alboseriata** Reitter, 1908. Nord de Chypre, 1, VII-1974 (ALZIAR); Akaki (Nicosia), 1, 18-V-1977 (H.ALZIAR !).

Baris chlorizans Germ., 1824. Kiti (CTGN).

Baris timida (Rossi), 1792. Kiti, Paphos, Nicosia, Perapedhi, Agros (CTGN); GEORGHIOU 1977; Akaki (Nicosia) 1, 18-V-1977 (H.ALZIAR !).

Sphenophorus piceus (Pallas), 1776. Famagusta (CTGN).

Anthonomus cyprius Marshall, 1925. Cat. Winkler, 1932; Cat. Junk, 1934; Platanistasa (CTGN); GEORGHIOU 1977.

Anthonomus pomorum (L.), 1758. Ayios Demetrios, Ay. Koroni, Kalapanayiotas, Moutoulla, Nicosia, Panayia (CTGN); GEORGHIOU 1977.

Bradybatus abeillei Desbr., 1888. Cat. Winkler, 1932; Cat. Junk, 1934.

Curculio elephas (Gyll.), 1836. Larnaca, Kalochorio, Skoulli, Lapithos (CTGN): une simple observation de l'ensemble des exemplaires présents dans cette collection permet de voir qu'il y a en leur sein au moins deux espèces différentes; ils sont donc tous à revoir; GEORGHIOU 1977.

Sibinia arenariae Stephens, 1831. Ayios Vassilios (Nicosia), 1, mai 1974 (ALZIAR), vu par CALDARA et cité dans sa révision (1984).

Sibinia attalica (Gyll.), 1836. Nicosia (CTGN).

Sibinia aureofulva Desbr., 1875. Ayios Vassilios, Episkopi, CALDARA 1984; Akaki (Nicosia), 1, 25-V-1977 (ALZIAR).

Sibinia phalerata Gyll., 1836. Ayios Vassilios (Nicosia), 1, 21-V-1974 (ALZIAR); CALDARA 1984.

Sibinia planiuscula Desbr., 1873. Larnaka, Famagusta (CTGN); GEORGHIOU 1977.

Tychius bicolor Ch.Bris., 1862. Ayios Vassilios (Nicosia), 4, du 22-V au 7-VI 1974 (ALZIAR); Mammari (Nicosia), 2, 1-VI-1974 (ALZIAR); CALDARA 1986.

Tychius crypticus Caldara, 1986. Alasia, CALDARA 1986.

Tychius morawitzii Becker, 1864. Nicosia (CTGN). Exemplaires à revoir par suite des confusions possibles avec **T. crypticus**.

Tychius cupricolor Penecke, 1935. Akroteri, CALDARA 1990.

***Cionus olivieri** Rosenh., 1838. Lapithos (Kyrenia), 1, 30-V-1974 (ALZIAR).

***Cionus schultzei** Reitter., 1904. Lapithos (Kyrenia), 12, 30-V-1974 (ALZIAR).

Cionus thapsus (F.), 1792. Larnaca Lapithou (CTGN); GEORGHIOU 1977.

***Corimalia minutissima** (Tourn.), 1867. Panagra (Kyrenia), 13, 8-VI-1974, sur *Tamarix* (ALZIAR).

***Corimalia quadrivirgata** (Costa), 1863. Panagra (Kyrenia), 1, 8-VI-1974, sur un *Tamarix* (ALZIAR).

Mecinus circulatus (Marsh.), 1802. Vati (CTGN); GEORGHIOU 1977.

Cryptorhynchus mangiferae, F., 1775. Paphos (CTGN). Accidentellement importé.

Smicronyx basalis Schultze, 1897. Limassol (CTGN).

Procas sauleyi (Rche.), 1857. Cat. Winkler, 1932.

Echinocnemus femoralis Marsh., 1950. Famagusta (CTGN); GEORGHIU 1977.

Pachytychius basimaculatus Voss., 1964. Larnaka, CALDARA 1978.

Pachytychius hordei (Brullé), 1832. GEORGHIU 1977.

Pachytychius hordei subsp. *hordei*. (Brullé), 1832. Nicosia, Famagusta, Larnaca (CTGN); Akaki (Nicosia), 2, 9 et 18-V-1977 (H.ALZAR !); Larnaca, CALDARA 1978; Paralimni, Protaras (Larnaca), 1, 5-III-1995 (ALZAR).

**Orthochaetes penicillus* Gyll., 1836. Ayios Vassilios (Nicosia), 22-V-1974 (ALZAR).

APIONINAE

Apion ochropus Germ., 1818. Platus, Krios River, mt. Troodos, Mesopotamis, BALFOUR-BROWNE 1944.

Apion tubiferum Gyll., 1833. Pera Pedi, Moniatas, Mt. Troodos, Krios River, BALFOUR-BROWNE 1944; Nicosia (CTGN); Skarinou (Larnaca), 1, 20-III-1984 (ALZAR); Stavrovouni (Larnaca), 1, 26-III-1984 (ALZAR et P.EWALD).

**Apion (Phrisotrichium)* sp. Kilani (Limassol), 1, 27-III-1984 (ALZAR): cet exemplaire se caractérise par sa couleur foncière bleue, son revêtement de soies blanches dressées et longues (comme chez *A. tubiferum*) et ses interstries concaves et subcarénés sur les bords (comme chez *A. perrisi*).

Apion violaceum Kirby, 1808. BALFOUR-BROWNE 1944.

Apion malvae (F.), 1775. Nicosia, forêt d'Akrotiri, mt. Troodos, Pera Pedi, Kilani, Krios River, BALFOUR-BROWNE 1944; Ayios Yeoryios, Nicosia (CTGN); Mammari (Nicosia), 2, 1-VI-1974 (ALZAR); GEORGHIU 1977; Akaki (Nicosia), 6, les 30-IV, 10 et 16-V-1977 (H.ALZAR !).

Apion stolidum Germ., 1817. BALFOUR-BROWNE 1944.

Apion confluens Kirby, 1808. Kilani, Krios River, BALFOUR-BROWNE 1944.

Apion detritum Muls. et Rey, 1858. Ayia Mavi Monastery, BALFOUR-BROWNE 1944

Apion carduorum Kirby, 1808. Mammari (Nicosia), 1, 1-VI-1974, sur un *Tamarix* (ALZAR)

Apion scalptum Muls. et Rey, 1858. Akrotiri Forest, Cherkes, Zakaki, Pera Pedi, Episcopi, BALFOUR-BROWNE 1944 (sub *A. pilicorne* Desbr., 1875).

Apion onopordi Kirby, 1808. BALFOUR-BROWNE 1944.

**Apion aeneum* (F.), 1775. Nicosia, Limassol, mt. Troodos, Krios River, Platus, Mesopotamis, BALFOUR-BROWNE 1944; Nicosia, entre Paléomilo et Prodépino (CTGN); GEORGHIU 1977; Akaki (Nicosia), 7, du 3 au 9-V-1977 et 1 le 8-V-1978 (H.ALZAR !); Vallée des Cèdres (Paphos), 1, 20-IV, 1991, ± 1100m, battage de Cerisiers (EWALD !).

Apion radiolus Marsham, 1802. BALFOUR-BROWNE 1944; Nicosia, Pedhoulas (CTGN); GEORGHIU 1977; Akaki (Nicosia), 9 mâles et 3 femelles, du 3 au 25-V-1977; même localité, 1 femelle, 8-V-1978, sous *Corydolithus capitatus* (H.ALZAR !).

Apion dispar (Germ.), 1817. BALFOUR-BROWNE 1944

Apion hookeri Kirby, 1808. BALFOUR-BROWNE 1944.

Apion semivittatum Gyll., 1833. Pedula [?], Limassol, Platus, Krios River, mt. Troodos, Mesopotamis, Pera Pedi, Kilani, BALFOUR-BROWNE 1944; Famagusta (CTGN); GEORGHIU 1977; Panagra (Kyrenia), 10, 8-VI-1974, en battant du *Pistacia lentiscus* (ALZAR).

Apion rufescens Gyll., 1833 subsp. *notatum* Wagn., 1912. Limassol, Episcopi, Pera Pedi, Krios River, Kilani, Akrotiri Bay, BALFOUR-BROWNE 1944.

Apion corniculatum Germ., 1817. Nicosia (CTGN).

Apion longirostre Ol., 1807. Famagusta, BALFOUR-BROWNE 1944; Platres, Famagusta (CTGN); GEORGHIU 1977.

Apion cruentatum Walton, 1844. BALFOUR-BROWNE 1944.

Apion miniatum Germ., 1833. Episcopi, BALFOUR-BROWNE 1944 (citation de l'espèce accompagnée de l'indication "? var."). Quant aux exemplaires d'*Apion "miniatum"* du CTGN doivent être revus à la lumière des nouvelles conceptions concernant le sous-genre; localités citées: Nicosia, Apliki, Kondea; GEORGHIU 1977.

Apion pubescens Kirby, 1811. Famagusta, BALFOUR-BROWNE 1944.

Apion atomarium Kirby, 1808. BALFOUR-BROWNE 1944.

Apion bifarium Balf.-Br., 1944. Platus, Krios River, mt. Troodos, Mesopotamis, Palacomylos, Pera Pedi, BALFOUR-BROWNE 1944

Apion ononcola Bach, 1854. BALFOUR-BROWNE 1944.

Apion fulvipes (Fourcroy), 1785 (= *flavipes* Payk.). BALFOUR-BROWNE 1944.

Apion aestivum Germ., 1808. Akrotiri Forest, Cherkas, BALFOUR-BROWNE 1944; Ay. Amurosios (CTGN); GEORGHIU 1977.

Apion nigritarse Kirby, 1808. Pera Pedi, Krios River, Ayia Mavi, Kilani, BALFOUR-BROWNE 1944; Famagusta (CTGN); GEORGHIU 1977.

Apion cyprium Balf.-Br., 1944. Limassol, Episcopi, Akrotiri Bay, BALFOUR-BROWNE 1944

Apion croceifemoratum Ksw., 1864. Mt. Troodos, BALFOUR-BROWNE 1944, (sub *A. flavofemoratum* var. *croceifemoratum* Gyll.); Lefkara (CTGN).

Apion ononis Kirby, 1808. Mt. Troodos, Platus, Krios River, Mesopotamis, BALFOUR-BROWNE 1944.

Apion viciae Paykull, 1798. Mt. Troodos, Krios River, Mesopotamis, Pera Pedi, BALFOUR-BROWNE 1944 (CTGN); GEORGHIU 1977.

Apion vorax Herbst, 1797. Mt. Troodos, Krios River, Mesopotamis, Platus, BALFOUR-BROWNE 1944; (CTGN); GEORGHIU 1977; Stavros tis Psokas, I, 21-IV-1991 (EWALD I).

Apion tenue Kirby, 1808. Episcopi, BALFOUR-BROWNE 1944.

RHYNCHITINAE

Rhynchites ruber Fairm., 1859. Morphou, Kapouti (CTGN); GEORGHIU 1977.

OBSERVATIONS

A la lecture de cette première contribution on s'aperçoit aisément des lacunes immenses qui subsistent dans la connaissance des Curculionides de l'île de Chypre. D'une part bien des parties de l'île de donnent lieu à aucune citation, d'autre-part beaucoup de ces dernières sont assez anciennes et les insectes concernés demandent à être revus (*Strophomorphus*, *Apion*, divers Cleoninae ...), enfin on constate quelques déterminations hâtives ayant donné lieu à des confusions perpétuées dans la littérature. Il est presque banal de rappeler que le milieu insulaire est propice à la découverte lors d'études, de taxons endémiques jadis confondus avec leurs parents continentaux, voire, souvent, d'espèces ou genres bien isolés rencontrés lors de recherches de terrains un peu poussées.

BIBLIOGRAPHIE

BALFOUR-BROWNE, J., 1944. A contribution to the knowledge of the Apioninae of Cyprus. *Bull. Soc. Fouad 1er Ent.*, 28: 147-154.

CALDARA, R., 1978. Revisione dei *Pachytychius* paleartici. *Mem. Soc. ent. Ital., Genova*, 56: 131-216.

CALDARA, R., 1985. Revisione delle *Sibinia* paleartiche. *Mem. Soc. ent. Ital., Genova*, 62/63: 24-105 (1983-1984).

CALDARA, R., 1986. Revisione dei *Tychius* precedentemente inclusi in *Lepidotychius* (N. Syn.). *Atti Soc. ital. Sci. nat. Museo civ. Stor. nat. Milano*, 127 (3-4): 141-194.

CALDARA, R., 1990. Revisione tassonomica delle specie paleartiche del genere *Tychius* Germar (Coleoptera Curculionidae). *Mem. Soc. Ital. Sci. Nat. Mus. Civico Storia Nat. Milano*, 25(3): 53-218.

CSIKI, E., 1934. *Coleopterorum Catalogus*. Pars 137. Curculionidae: Hyperinae (Dr. W. Junk, Gravenhage)

DALLA-TORRE, K. W. von, EMDEN, M. van, & EMDEN, F. van, 1936 et 1937. *Coleopterorum Catalogus*. Pars 147 et 153. Curculionidae: Brachyderinae I et II. (Dr. W. Junk, Gravenhage).

DIECKMANN, L., 1968. Revision der westpaläarktischen Anthonomini. *Beitr. Ent.*, 17(3/4): 377-564.

FOLWACZNY, B., 1973. Bestimmungstabelle der paläarktischen Cossoninae ohne die nur in China und Japan vorkommenden Gattungen nebst Angaben zur Verbreitung. *Ent. Blätter*, 69: 65-180.

GEORGHIU, G., 1977. *The insects and mites of Cyprus*. Kiphissia, 347 p.

GONZALEZ, M., 1970. El género *Desbrochersella* Reitter. *Public. Inst. Biol. apl. Barcelona*, 50: 5-16.

HOFFMANN, A., 1950. *Faune de France* - 52 - Coléoptères Curculionides (Première Partie). Lechevalier, Paris, p. 1-486.

HOFFMANN, A., 1954. *Faune de France* - 59 - Coléoptères Curculionides (Deuxième Partie). Lechevalier, Paris, p. 487-1208.

HOFFMANN, A., 1958. *Faune de France* - 62 - Coléoptères Curculionides (Troisième Partie). Librairie de la Faculté des Sciences, Paris, p. 1209-1839.

LODOS, N., 1971. Preliminary list of Curculionidae with notes on distribution and biology of species in Turkey. 1. *Sitona* Germar. *Yearbook Faculty Agr. Univ. Ege, Izmir*, 2(1): 1-35.

OSELLA, G., ZUPPA, A. et LODOS, N., 1993. I Cossoninae d'Anatolia e regioni viciniori. *Fragm. Ent., Roma*, 24(2): 243-305.

VIEDMA, G. A. de, 1964. Contribución al conocimiento de la tribu Cneorrhini: revision de los géneros *Attactagenus* Tournier y *Philopodon* Stephens y

consideraciones acerca de **Cneorhinus** Schönherr, **Leptolepurus** Desbrochers, **Heydeonymus** Desbrochers y **Bletonius** Hoffmann. *Eos, Madrid*, **40**: 455-491.

PETRI, K., 1905. Bestimmungs-Tabelle der mir bekannt gewordenen Arten der Gattung **Lixus** Fab. aus Europa und den angrenzenden Gebieten. 2. Forsetzung. *Wiener Ent. Zeit.*, **24**(3-4): 101-116.

TEMPERE, G. et PERICART, J., 1989. *Faune de France -74- Coléoptères Curculionidae*, quatrième partie. Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles, Paris, 534 pp.

WINKLER, A., 1924-32. *Catalogus Coleopterorum regionis palaearcticae*. Albert Winkler ed., Wien, 1698 pp.

ZUMPT, F., 1937. Revision der palaarktischen **Brachycerus**-Arten. Curculioniden-Studien XXVII. *Ent. Blätter*, **33**: 348-374 et 385-426.

ZURCHER, 1919. La vraie provenance du **Polydrosus rhodiacus** Schilsky. *Bull. Soc. ent. France*, 1919: 159.